



مرهم للجلد

زيت كبد الحوت 20غ
أكسيد الزنك 27غ

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إذا كنت في شك، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.
- إذا تفاقمت أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فيرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي.

الشكل و العرض :

يقدم هذا الدواء على شكل مرهم جلدي في أنبوب سعة 40 غ.

التركيب :

المواد الفعالة :

زيت كبد الحوت 20غ
أكسيد الزنك 27غ
100 غ من المرهم.

السواغات :

ميثيل السيليلات، بوتيل هيدروكسي الأيزول، الفازلين، اللانولين، ماء نقي.

السواغات ذات التأثير المعروف :

لانولين، بوتيل هيدروكسي الأيزول.

دواعي الاستعمال العلاجي :

الفتة الصيدلانية العلاجية : مرطب و واق.
يستعمل هذا الدواء في حالات تهيج الجلد و خاصة في حالة الطفح الجلدي من الحفاضات (الأرداف الحمراء) عند الرضع.

الجرعة، طريقة و وتيرة الاستخدام و مدة العلاج :

يستخدم هذا الدواء عن طريق الجلد
تهيج الجلد : يوضع عدة مرات في اليوم، و يدلك برفق على المنطقة المتهيجة.

الأرداف الحمراء للرضيع : يوضع من 1 إلى 3 مرات في اليوم على المنطقة المتهيجة.
إذا كان لديك انطباع بأن تأثير هذا الدواء قوي جدًا أو ضعيف جدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

تهيج الجلد :

مدة الاستخدام محدودة بـ 5 أيام.

الأرداف الحمراء للرضيع :

مدة الاستخدام محدودة بـ 3 أيام.

تعليمات في حالة إغفال جرعة واحدة أو أكثر :

لا يوجد.

خطر متلازمة الانسحاب :

لا يوجد

موانع الإستعمال :

لا ينبغي استخدام هذا الدواء في الحالات التالية :
• حساسية معروفة تجاه أحد المكونات، و لا سيما الساليسيلات، و
• دهن الصوف (أو اللانولين)، أو المكونات الأخرى لهذا المرهم،
• الجروح النازة،
• الجروح الملتهبة.
إذا كنت في شك، فمن الضروري طلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال و تحذيرات خاصة :

هذا الدواء ليس علاجًا وقائيًا للطفح الجلدي عند الرضع. نظرًا لخطر انتقال فيتامين أ إلى الدم و بالتالي خطر الإصابة بنقص فيتامين أ،
فمن الضروري الالتزام بالجرعة و عدم تطبيق المرهم :

- على مساحة كبيرة،
- تحت ضمانة محكمة الإغلاق،
- على الأغشية المخاطية،
- على جلد تالف بشدة،
- عند الخداج.

تهيج الجلد : إذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام، إستشر الطبيب أو إستشر الصيدلي.

الأرداف الحمراء للرضيع : في حالة إستمرار طفح الحفاضات لأكثر من 3 أيام، إستشر الطبيب أو الصيدلي.
يحتوي هذا الدواء على اللانولين و قد يسبب تفاعلات جلدية (مثل الأكزيما).

يحتوي هذا الدواء على بوتيل هيدروكسي الإيزل و قد يسبب تفاعلات جلدية موضعية (أكزيما) أو تهيج في العينين و الأغشية المخاطية.

التفاعلات مع أدوية أخرى :

لا تستخدم هذا الدواء مع أو بعد مطهر بخصائص مؤكسدة.

التفاعلات مع الأطعمة و المشروبات :

لا يوجد.

الخصوبة، الحمل و الرضاعة :

لا ينبغي استخدام هذا الدواء أثناء الحمل إلا بناء على نصيحة طبيبك.
لا يجب استخدامه على الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية بسبب خطر ابتلاع الرضيع للمنتج.

إذا كنت حاملًا أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

سياقة المركبات و استخدام الآلات :

لا يوجد.

الآثار الجانبية المحتملة :

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

قد يتسبب هذا الدواء، لدى بعض الأشخاص، في حدوث تأثيرات ضارة أو أقل، لا سيما خطر الحساسية تجاه أحد المكونات (الساليسيلات أو دهن الصوف أو اللانولين ...) التي تتطلب التوقف عن العلاج.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة من خلال نظام الإبلاغ الوطني : المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية و العتاد الطبي (CNPM) الموجود في طريق سطاوالي الصغرى (NIPA) دالي براهم الجزائر.
الهاتف : 18 66 39 20 (0) 213 +
البريد الإلكتروني : cnpm@cnpm.org.dz

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، فإنك تساعد في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

الإفراط في الجرعة :

حالة تناول جرعة زائدة، هناك خطر حدوث تأثيرات نظامية (فرط الفيتامينات).

عدم التوافق :

لا يوجد.

مدة الحفظ :

قبل الفتح : 36 شهر.

بعد الفتح : 6 أشهر.

شروط الحفظ :

- يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.
- يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30° م بعيدا عن الرطوبة و الضوء.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.
- يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

طبيعة العبوة الخارجية :

أنبوب سعة 40 غ.

احتياطات خاصة للتخلص منه و التعامل معه :

لا تتخلص من أي دواء في المجاري أو مع النفايات المنزلية هذه الإجراءات ستساهم في حماية البيئة.

شروط تسليم العلاج :

خارج القائمة.

اسم و عنوان صاحب مقر التسجيل :

ش د م م مخابر فارمغرب

الطريق الرئيسي رقم 01، ملاكو، تيارت - الجزائر.

اسم و عنوان مختلف الأطراف المشاركة في تصنيع المنتج النهائي، موقع انتاج المنتجات الوسيطة السائبة الأولية و الثانوية، التعبئة و التغليف، إطلاق الدفعات :

ش د م م مخابر فارمغرب

الطريق الرئيسي رقم 01، ملاكو، تيارت - الجزائر.

الهاتف : 18 66 39 20 (0) 213 +

560 04 04 90 (0) 213 +

مقر التسجيل رقم : 22/99/07 A 006/088

تاريخ مراجعة النشرة : 2025/07/24

LABORATOIRES
PHARMAGHREB



Pommade Dermique

Huile de foie de morue 20g
Oxyde de Zinc 27g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

FORME ET PRÉSENTATION :

Ce médicament se présente sous forme de pommade dermique en tube de 40g.

COMPOSITION :

Principes actifs :

Huile de foie de morue 20 g
Oxyde de zinc 27 g
Pour 100 g de pommade

Excipients :

Salicylate de méthyle, butylhydroxyanisole, vaseline, lanoline, eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Lanoline, butylhydroxyanisole.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : EMOLIENS ET PROTECTEURS.

Ce médicament est indiqué en cas d'irritation de la peau, notamment en cas d'érythème fessier (fesses rouges) du nourrisson.

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION ET DURÉE DU TRAITEMENT :

Ce médicament s'administre par voie cutanée.

- Irritation de la peau : en application plusieurs fois par jour en massant légèrement sur la zone irritée.
- Erythème fessier du nourrisson : en application 1 à 3 fois par jour sur la zone irritée.

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Irritation cutanée : la durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

Fesses rouges du nourrisson : la durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

Instruction en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage :

Sans objet.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :

- Allergie connue à l'un des composants, notamment aux salicylés, à la graisse de laine (ou lanoline), ou aux autres constituants de la pommade,
- Lésions suintantes,
- Lésions surinfectées.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPÉCIALES :

Ce médicament n'est pas un traitement préventif des fesses rouges du nourrisson. En raison du risque de passage de la vitamine A dans le sang et donc du risque d'hypervitaminose, **il est impératif** de respecter la posologie et de ne pas appliquer la pommade :

- sur une grande surface,
- sous pansement occlusif,
- sur une muqueuse,
- sur une peau profondément lésée,
- chez le prématuré.

Irritation cutanée : en cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez un médecin ou demandez conseil au pharmacien.

Fesses rouges du nourrisson : dans le cas où l'érythème fessier du nourrisson persiste au-delà de 3 jours consultez un médecin ou demandez conseil au pharmacien.

Ce médicament contient de la graisse de laine (ou lanoline) et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple: eczéma).

Ce médicament contient du butylhydroxyanisole et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS :

Ne pas utiliser ce médicament avec ou après un antiseptique aux propriétés oxydantes.

Interaction avec les aliments, les boissons et l'alcool :

Sans objet.

FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Ne pas appliquer sur les seins pendant l'allaitement en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DE VÉHICULES ET A UTILISER DE MACHINES :

Sans objet.

EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment le risque d'allergie à l'un des composants (salicylés, graisse de laine ou lanoline...) nécessitant l'arrêt du traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre National de Pharmacovigilance et de Matérovigilance (CNPM) sis à ROUTE Petit Staoueli (NIPA) Dély Ibrahim Alger.

Tél. : +213 (0) 20 39 66 18

Mail : cnpm@cnpm.org.dz

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage il y a un risque d'effet systémique (hypervitaminose).

INCOMPATIBILITE :

Sans objet

DURÉE DE CONSERVATION :

Avant ouverture : 36 mois.

Après ouverture : 6 mois.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

- Tenir hors de la portée des enfants.

- À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR :

Tube de 40g .

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION ET DE MANIPULATION :

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement

CONDITIONS DE DELIVRANCE :

Hors liste.

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

SARL LABORATOIRES PHARMAGHREB

Route principale N°01, Mellakou Tiaret - Algérie.

NOM ET ADRESSE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DANS LA FABRICATION DU PRODUIT FINI, LE SITE DE PRODUCTION DES :

PRODUITS INTERMÉDIAIRES / VRAC / CONDITIONNEMENTS (PRIMAIRE ET SECONDAIRE), LIBÉRATION DES LOTS :

SARL LABORATOIRES PHARMAGHREB

Route principale N°01, Mellakou Tiaret - Algérie.

Tél. : +213 (0)20 39 66 18

+213 (0)560 04 04 90

NUMERO DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

22/99/07 A 006/088

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 24/07/2025



NO008.10